

HEREDITĀRĀ JEB IEDZIMTĀ ANGIOEDĒMA

SIMPTOMI

Galva

Sejas tūska (ādas un gļotādas)

Rīkle

Apgrūtināta rīšana, balss izmaiņas, aizsmakums, mēles, elpceļu un balsenes tūska, smagos gadījumos - asfiksija

Kuņģa-zarnu trakts

Vēdera priekšējās sienas tūska, diskomforts, stipras vēdera sāpes zarnu gļotādas tūskas dēļ

Urīnpūslis

Sāpes urīnpūšļa un jostas vietas apvidū, samazināts urīna daudzums urīnceļu vai urīnpūšļa tūskas dēļ

Dzimumorgāni


Ārējo dzimumorgānu tūska

Āda

Spiediena un pietūkuma sajūta

Ekstremitātes

Tūska, samazināts kustību apjoms, apgrūtināta staigāšana tūskas dēļ



HEREDITĀRĀ JEB IEDZIMTĀ ANGIOEDĒMA (HAE)

- Primārs imūndeficīts, kas izpaužas ar atkārtotām zemādas audu tūsku dažādās ķermeņa daļās
- Pārmantojas autosomāli-dominanti, bet bieži novēro spontānas mutācijas
- Tās prevalence ir 1:50 000 - 150 000
- HAE rodas komplementa komponenta C1 esterāzes inhibitora deficīta rezultātā
- Simptomi var parādīties jebkurā vecumā
- HAE visbīstamākā izpausme ir balsenes tūska, kas rada dzīvībai bīstamu situāciju - elpceļu obstrukciju
- Diagnostikā izmanto C4 komplementa komponenta līmeņa, C1 inhibitora koncentrācijas un aktivitātes noteikšanu asins serumā
- HAE nav alerģiska tūska, tāpēc tā nereaģē uz antihistamīniem un kortikosteroīdiem
- Latvijā ir pieejama HAE specifiskā terapija

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

- www.angioedema.lv
- Reto slimību koordinācijas centrs BKUS, tel. 67514618
- Atbalsta vienība RAKUS, tel. 67042537
- Atbalsta vienība PSKUS, tel. 26512606